

# COHABITER AVEC LE LÉROT



## CARTE D'IDENTITÉ

**Nom latin :** *Eliomys quercinus*

**Famille :** Gliridés

**Taille :** 10 à 17 cm de corps, 9 à 15 cm de queue

**Poids :** 50 à 120 g (peut atteindre 200 g avant l'hiver)

**Alimentation :** omnivore (fruits, graines, insectes, vers, oisillons, petits mammifères, œufs...)

**Habitat :** espèce arboricole appréciant les forêts, haies, vergers, jardins et maisons (greniers)

## DES INDICES POUR L'IDENTIFIER

### LÉROT, LOIR GRIS OU MUSCARDIN : COMMENT LES DIFFÉRENCIER ?

Ces petits rongeurs appartiennent tous les trois à la même famille. Le lérot a un "masque" noir caractéristique et sa queue se termine par des poils en pinceau noirs et blancs. Le loir gris a une queue touffue et un pelage gris (ou gris-roux). Le muscardin adulte a de petites oreilles, et son pelage et sa queue sont roux orangé.



### EMPREINTES

Pattes antérieures à 4 doigts, mais pattes postérieures à 5 doigts



LÉROT



LOIR GRIS



MUSCARDIN

## INTERACTIONS AVEC LE LÉROT

- Le lérot est un rongeur essentiellement nocturne, mais pouvant avoir une activité diurne ponctuelle. Il hiberne généralement de septembre-octobre à avril lorsque les températures sont inférieures à 10°C mais peut se réveiller pour grignoter ou faire ses besoins. Si un animal fait régulièrement du bruit en plein hiver dans votre grenier, il est plus probable qu'il s'agisse d'un rat, d'une souris ou d'une fouine
- Parfois, des petits non sevrés tombent du nid et ne sont pas récupérés par leur mère ; ils sont alors en grand danger face aux chats, aux rapaces et aux fouines.

Crédits photos : iStock

## 1 PRÉSENCE DANS LES COMBLES ET VERGERS

Contrairement à d'autres rongeurs, le lérot n'a en général qu'une portée par an et ne pullule pas.

Il peut élire domicile dans le grenier d'une habitation. Il arrive alors qu'il dérange les habitants en faisant du bruit la nuit, laisse derrière lui des excréments ou s'attaque aux matériaux isolants (laine de verre ou d'acier...). Friand de fruits, il peut aussi faire des dégâts dans les vergers.

### Solutions :

Pour éviter que des rongeurs ne s'introduisent dans la maison :

- Limiter l'accès à toutes les sources de nourriture, par exemple en stockant les déchets dans des poubelles et des containers à ordures hermétiques.
- Désherber et éclaircir la végétation dense sur une bande de 1,5 m autour de sa maison en élaguant les branches d'arbre et plantes grimpantes pouvant servir de passerelles jusqu'aux toits.
- Boucher les accès comme les trous et les fissures de plus de 0,5 cm avec du plâtre, du ciment ou des pierres (ne pas utiliser de mousse expansive qui peut être rongée) ; utiliser des grilles avec un maillage serré (< 0,5 cm) pour bloquer l'accès aux ventilations.
- Utiliser à bon escient des odeurs qui dérangent les rongeurs, comme du poivre, du vinaigre, de l'huile essentielle d'eucalyptus. Il est aussi possible d'enfumer ses combles avec de l'encens. Éviter les répulsifs chimiques.

## 2 OFFRIR UN ABRI DE SUBSTITUTION

Une fois que la maison est « sécurisée », il est aussi possible d'offrir des gîtes de substitution aux lérots loin des lieux de vie.

- Utiliser un gîte pour rongeurs en bois garni de matériaux moelleux (poils, plumes, laine, mousse, tissu doux). Installez-le à 2-3 mètres du sol, loin de toute branche qui pourrait permettre aux prédateurs d'y accéder.
- Si vous souhaitez le construire : [https://document.environnement.brussels/opac\\_css/elecfile/RT\\_Gites\\_Lerot\\_D\\_EF\\_FR.pdf](https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RT_Gites_Lerot_D_EF_FR.pdf)

## 3 CAPTURER ET RELÂCHER UN LÉROT

- Si malgré tout des lérots indésirables élisent domicile dans une habitation, il est possible de les piéger pour les relâcher dans la nature. Utiliser une cage ou une nasse (se fier aux crottes pour le choix du lieu), et les appâter avec un bout de fromage, des graines ou des fruits (raisin, pommes, prunes, noix, amandes, noisettes par exemple).
- Si la capture se fait de mai à juin, il est possible qu'il s'agisse d'une femelle ayant des petits. Penser alors à vérifier si ses tétines (5) sont visibles et roses, auquel cas elle pourrait avoir une portée quelque part susceptible de mourir de faim sans elle.
- Relâcher les lérots à au moins 4 km, si possible à proximité d'une forêt ou de zones boisées. Penser à recouvrir la cage avec un tissu ou un drap pour limiter leur stress lors du transport.

Fiche pédagogique proposée par Takoda

Rédaction par Anaïs Collette - Relecture et correction  
par PRÉNOM(S) NOM(S)



associationtakoda@gmail.com



07 68 62 01 72

Takoda